



زمینه فعالیت شرکت:

- مواد ضد عفونی کننده و گندزدا
- ملزومات استریل
- اندیکاتور های شیمیایی
- اندیکاتور های بیولوژیکی
- تست های فرایند شستشو
- کاغذ هدیکال یا رول های بسته بندی استریل
- تجهیزات و دستگاه
- (اتوکلاو کلاس B، دستگاه سیلر، دستگاه التراسونیک)

عفونت‌های ادراری

عفونت‌های ادراری بیمارستانی (HAUTI)

عفونت‌های ادراری شایع‌ترین عفونت‌های بیمارستانی است که حدود یک‌سوم موارد را تشکیل می‌دهند.

اکثر این عفونت‌ها به دنبال استفاده مستقیم از وسایل و ابزار پزشکی در سیستم ادراری به وجود می‌آیند. حدود ۸۰ درصد موارد به علت استفاده از کاتترهای ادراری است؛ به همین دلیل، در برخی موارد به این عفونت‌ها عفونت‌های ادراری ناشی از کاتتر (CAUTI) اطلاق می‌شود.

در ۱۰ الی ۲۰ درصد افرادی که سوند ادراری کوتاه مدت داشته‌اند باکتریوری دیده می‌شود که فقط ۲ درصد آنها علائم ادراری دارند که به صورت عفونت ادراری ظاهر می‌شود.

همچنین، در بیمارانی که سوند ادراری دارند به ازای هر روز، ۵ درصد احتمال بروز باکتریوری وجود دارد و در افرادی که بین ۴ تا ۶ هفته سوند داشته‌اند، احتمال باکتریوری به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

شایع‌ترین میکروارگانیسم‌های مولد عفونت‌های ادراری بیمارستانی عبارت‌اند از:

1. *Escherichia coli*

2. *Enterococcus spp.*

3. *Candida* spp.

4. *Pseudomonas aeruginosa*

5. *Klebsiella* spp.

6. *Proteus* spp.

7. *Other Enterobacteriaceae*

8. *Acinetobacter* spp.

9. *Other nonfermenters*

